


Sumilarv®  
0.5G

Único en su clase  
Doble persistencia  
a mitad de dosis\*<sup>1</sup>




## Nuevo larvicida de listo uso




- Listo para usar
- Elevada persistencia; hasta 12 semanas
- Alta eficacia a dosis muy bajas; 10gr/1m<sup>2</sup>
- Modo de acción único y sin resistencias.
- Baja toxicidad para los mamíferos.

### Actividad , eficacia y persistencia imbatible



#### Actividad biológica extremadamente alta.

Sumilarv ® es 100 veces más eficaz contra larvas de mosca doméstica (*Musa domestica*, larvas de 4 días) que otros compuestos.



#### Persistencia extrema

Sumilarv ® presenta una eficacia con actividad residual muy superior al resto de compuestos presentes en el mercado.

<sup>1</sup> Comparado con el resto de larvicidas de listo uso disponibles en el mercado. Mayo 2021

Sumilarv®  
0.5G

**LARVICIDA**  
gránulo dispersable



**COMPOSICIÓN:**  
0.5% Pyriproxyfen



**PRESENTACIÓN:**  
Envase: Saco 5Kg  
UDS/CAJA: 2

### CARACTERÍSTICAS;

SUMILARV es un nuevo agente de **control de larvas** listo para usar basado en **Pyriproxyfen**, un regulador del crecimiento de insectos (IGR) que imita la hormona juvenil del insecto, actúa sobre el ciclo normal del mismo, impidiendo su desarrollo de la fase larvaria a la adulta.

Con un **modo de acción único** a bajas dosis; afecta a la fisiología y la morfogénesis, la reproducción y la embriogénesis específicas de los insectos;

- Inhibe el ciclo vital en la muda de pupa/adulto
- Las larvas/pupas se desarrollan normalmente pero no pueden convertirse en adultos
- Afecta a la puesta, viabilidad de los huevos, el apareamiento y el desarrollo del esperma.

Su acción reguladora del crecimiento se traduce en una reducción del número de insectos adultos.

### MODO DE EMPLEO;

Aplicar Sumilarv® 0,5G esparcido manualmente o con maquinaria sobre zonas donde se desarrollan las larvas; fosas de purín, estercoleros, emparrillados de estabulaciones, fosas sépticas, etc.

**Como norma general**, tratar después de la retirada del estiércol y repetir el tratamiento después de cada retirada o cuando las larvas de mosca sean observadas.

**En alojamientos para animales:** Esparcir Sumilarv® 0,5G lo más uniformemente posible sobre la superficie del estiércol con especial atención alrededor de los pilares, los postes y las esquinas, donde el estiércol tiende a acumularse.

**Aplicación en pilas de estiércol:** esparcir Sumilarv® 0,5G tan uniformemente como sea posible sobre toda la superficie de la pila.

Repetir el tratamiento de 4 a 8 semanas, en función de la dosis utilizada o si la capa de purín o estiércol ha incrementado en 10cm.

Para una acción más rápida contra las moscas, se puede usar un adulticida además de este producto.

### DOSIFICACIÓN

El producto debe aplicarse cuando las moscas comienzan a aparecer y cuando las temperaturas son favorables a su propagación (entre 10 y 35°C). Utilizar las siguientes dosis de aplicación:

para infestaciones bajas de moscas; 20 g/m<sup>2</sup> (2 kg/100 m<sup>2</sup>) proporciona suficiente control de las larvas de mosca 2 meses después de la aplicación.

Para infestaciones elevadas de moscas; 10 g de producto/m<sup>2</sup> (1 kg/100 m<sup>2</sup>) con un intervalo de 1 mes entre las aplicaciones proporcionarán un control suficiente de las larvas de mosca 3 meses después de la primera aplicación.